


המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ

The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 4610302 P.O.Box: 384, Herzlia B'
 טל': 09-9604000 (רב-קווי), פקס: 09-9604030 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010

07/06/2023

למגדלים, מדריכים ופקחים,

בשבועות האחרונים רואים עלייה מתמדת בנגיעות בהליותיס ורוב החלקות נכנסו לסבב טיפולים ראשון.

המלצות ומדיניות מועצת הכותנה הן:

ניטור קפדני באזורים שונים של החלקות, על מנת לבדוק את הצורך בטיפול. סף הפעולה בשלב זה הינו 2 זחלים מגודל 3 מ"מ למטר שורה. יש להתייחס לנוק מצטבר שעשוי להיות בחלקה ולעיתים להקדים טיפול כדי למנוע אותו.

רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכותנה:


תכשיר	חומר פעיל	מס' קבוצה כימית	מינון סמ"ק/ד'
טאקומי	Flubendiamid	28	15 ג'/ד'
אמפליגו	Chlorantraniliprole +	28	20
	Lambda Cyhalothrin	3 A	
דוריבו	Thiamethoxam +	4 A	30
	Chlorantraniliprole	28	
אוונט	Indoxacarb	22 A	40
אלוורדה	Metaflumizon	B22	100
ספרטה סופר	Spinetoram	5	50
ארמדה	Spinetoram	5	40
	Methoxyfenozide	18	
פרוקליים/ נוקאאוט	Emamectin Benzoate	6	40
דנים	Lufenuron +	15	10 ג'/ד'
	Emamectin Benzoate	6	
דורנים	Lufenuron +	15	100
	Emamectin Benzoate	6	
בז	Pyridalyl	מנגנון לא ידוע	20
פירתרואידים			75

יש להתייחס לקבוצות הכימיות השונות בבחירת החומרים להדברה. יש לעשות אלטרנציה בין הקבוצות השונות על מנת למנוע את החשיפה של דור מסוים לאותה קבוצה פעמיים, ובכך לדחות התפתחות עמידות.

חשוב לציין שתכשירי ההדברה להליותיס הינם קוטלי זחלים. הזחלים מפסיקים את אכילתם, אך התמותה מתרחשת לאחר 72-24 שעות לאחר ספיגת החומר. לכן, אם נכנסים לשטח בסמוך לריסוס יתכן וימצאו זחלים חיים, אך אלו לא גורמים נזקים.

בחלקות עם נגיעות בזיפית יש לשלב פירתרואיד.

המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 4610302 P.O.Box: 384, Herzlia B'
Tel: 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010 09-9604030 :פקס (רב-קווי), טל': 09-9604000

הלקטית ורודה - ההמלצה שלנו היא ליישם את הבלבול פעמיים. יישום הבלבול השני מומלץ כאשר הצמחים נוחים לתליית החוטים.

את החוטים יש לתלות על גבי הגבעול המרכזי ולא על ענף צדדי, כדי למנוע את נפילת החוט.

ליווי של העובדים בשטח חיוני ליישום מדויק יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול.

בנוסף, מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיית עשי המזיק באמצעות **מלכודות** בשטח. לכידה של עשים במלכודות מהווה רק אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח. כמו גם, לשים לב לנוכחות זחלים בפרחים ("רוזטות").

כנימות עלה - כאשר ההשקיה סדירה, ניתן להגמיע קונפידור ודומיו **במידת הצורך**, יש להקפיד על היישום בשליש השני של ההשקיה.

לכל התייעצות יש לפנות אלינו!

בברכה,

מיכל אקסלרוד ומתניה צונץ